

Table 5. Vejledende doseringer for sedativa, analgetika og antidoter ved sedation til voksne uden anæstesiologisk medvirken

Præparat	adm.	Anvendes til	Refrakte doser á	Antidot	Halverings-tider
PRÆMEDICIN					
Triazolam	sublin g.	sedation, gives 10-15 minutter før	0.125 – 0.375 mg	Flumazenil	2-4 timer
ANALGETIKA					
Morfin	i.v.	analgesi	1,25 – 5 mg	Naloxon	240 min
Fentanyl	i.v.	analgesi	0,025 – 0,05 mg	Naloxon	180 min
Alfentanil	i.v.	analgesi	0,25 – 1 mg	Naloxon	90 min
SEDATION					
Midazolam	i.v.	sedation	1 – 2,5 mg – 5 mg (afhængig af alder, vægt og procedure)	Flumazenil	2 timer
ANTIDOTER					
Naloxon	i.v.	overdosering af opiater	0.4 mg + evt. 0.4 mg		30 min
Flumazenil	i.v.	overdosering af benzodiazepiner	0,2 mg - 0,5 mg		50 min
ØVRIGE					
Atropin	i.v.	svær bradykardi	1 mg		
Adrenalin	i.v.	anafylaktisk shock	0.3 –0.5 mg i.m.		1,5 min